

Asbestbedingte Krankheitsbilder – Referenzkarte

Symptome · Latenzzeiten ·
Berufskrankheitsnummern

Krankheitsbild	Typische Symptome	Latenzzeit	BK-Nr.	Anmerkung
Asbestose (Asbeststaublunge / Lungenfibrose)	<ul style="list-style-type: none"> – Zunehmende Atemnot (erst bei Belastung, später in Ruhe) – Trockener Reizhusten – Feines Knisterrasseln bei Auskultation – Trommelschlegelfinger / Uhrglasnägel, Zyanose – Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit 	15–20 Jahre (Spanne: 10–40 J.)	BK 4103	Irreversible Lungenfibrose; kann zu Rechtsherzinsuffizienz führen.
Malignes Mesotheliom (Brust-, Bauchfell-, Herzbeutelkrebs)	<ul style="list-style-type: none"> – Brustschmerzen (oft ausstrahlend), Atemnot – Pleuraerguss, Bauchwasser (Aszites) – B-Symptomatik: Nachtschweiß, Fieber, Gewichtsverlust – Heiserkeit, Schluckbeschwerden (bei Ausbreitung) 	30–50 Jahre	BK 4105	Nahezu ausschließlich asbestbedingt; häufigste beruflich verursachte bösartige Tumorerkrankung in Deutschland.
Asbestbedingter Lungenkrebs (Bronchialkarzinom)	<ul style="list-style-type: none"> – Anhaltender Husten, Bluthusten – Brustschmerzen, Atemnot – Ungewollter Gewichtsverlust – Leistungsabfall, Abgeschlagenheit 	30–50 Jahre (Mittel: ~38 J.)	BK 4104 BK 4114¹	¹BK 4114: Lungenkrebs durch Zusammenwirken von Asbestfaserstaub und PAK. Bezugsgröße: Nichtraucher ohne Asbestexposition. Risikostufung: Nichtraucher + Asbest: bis 6-fach – Raucher ohne Asbest: bis 11-fach – Raucher + Asbest: bis 59-fach (Spitzenwert bis 90-fach).
Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom)	<ul style="list-style-type: none"> – Anhaltende Heiserkeit – Schluckbeschwerden, Fremdkörpergefühl – Schwellung der Halslymphknoten 	20–50 Jahre	BK 4104	Anerkannt bei nachgewiesener Asbestexposition und entsprechender Latenzzeit.
Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)	<ul style="list-style-type: none"> – Bauchschmerzen, Völlegefühl – Zunahme des Bauchumfangs – Unspezifische Verdauungsbeschwerden, Harndrang 	Bis zu 40 Jahre	§ 9 Abs. 2 SGB VII (Wie-BK)	Seit 2017 anerkannt – nicht formal in BKV-Liste, sondern über Öffnungsklausel (Wie-Berufskrankheit).
Gutartige Pleuraveränderungen (Plaques, Erguss)	<ul style="list-style-type: none"> – Atemnot (belastungsabhängig) – Brustschmerzen beim Atmen – Eingeschränkte Lungenfunktion 	Bis zu 40 Jahre	BK 4103	Pleuraplaques gelten als Expositionsmarker; Pleuraerguss kann Hinweis auf Mesotheliom sein – engmaschige Kontrolle empfohlen.

Praxishinweise für Arbeitsmedizin, Betriebsärzte und SiGeKo

Faserjahr-Definition

1 Faserjahr = Exposition gegenüber 1 Mio. kritischer Fasern / m³ über 8 Std./Tag an 240 Arbeitstagen / Jahr.

Anerkennungshürde Krebs

Für Lungen-, Kehlkopf- oder Eierstockkrebs ohne bestehende Asbestose i. d. R. Nachweis von mind. 25 Faserjahren erforderlich.

Nachgehende Vorsorge / EVA-Lunge

Lebenslanger Anspruch auf arbeitsmedizinische Betreuung. Früherkennungsprogramm EVA-Lunge (Niedrig-Dosis-CT) für Hochrisikogruppe: BK 4103 + Raucherhistorie + Alter > 55 Jahre.

Hinweis: Diese Übersicht wurde sorgfältig recherchiert. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Für medizinische Laien ersetzt sie keine ärztliche Beratung. Für Fachleute aus Medizin und Arbeitsschutz gelten maßgeblich die jeweiligen Vorschriften, insbesondere GefStoffV und TRGS 519, sowie die aktuelle medizinische Fachliteratur. © Deutsche Umweltakademie