

Krebserkrankungen – Referenzkarte

Krebserkrankung	Betroffenes Gewebe / Organ	Typische Symptome	Latenzzeit	BK-Nr.	Anerkennungsvoraussetzungen	Risikofaktoren / Besonderheiten	Heilbar?
Pleuramesotheliom (Brustfellkrebs)	Brustfell (Pleura) Rippenfell	Brustschmerzen, Atemnot Pleuraerguss, Reizhusten, Gewichtsverlust, Nachtschweiß	30–50 J. Ø ca. 40 J.	BK 4105	Nachweis beruflicher Asbestexposition ausreichend; kein Asbestose-Nachweis erforderlich	In ~80 % der Fälle asbestbedingt; auch kurzzeitige Hochexposition kann ausreichen; indirekter Kontakt möglich	Nein (palliativ)
Peritonealmesotheliom (Bauchfellkrebs)	Bauchfell (Peritoneum)	Bauchschmerzen, Aszites Völlegefühl, Gewichtsverlust, Unspez. Verdauungsbeschwerden	30–50 J.	BK 4105	Asbestexposition zweifelsfrei nachzuweisen	Seltenere Form des Mesothelioms; Fasern durch Gewebegängigkeit ins Bauchfell vorgedrungen	Nein (palliativ)
Lungenkrebs (Bronchialkarzinom)	Lungengewebe	Anhaltender Husten, Bluthusten, Atemnot, Brustschmerzen Gewichtsverlust, Leistungsabfall	30–50 J. (Mittel: ~ 38 J.)	BK 4104 BK 4114 (+ PAK)	Nachweis Asbestose ODER Nachweis hoher Faserbelastung (i. d. R. mind. 25 Faserjahre ohne Asbestose)	Nichtraucher + Asbest: bis 6-fach – Raucher ohne Asbest: bis 11-fach – Raucher + Asbest: bis 59-fach (Spitzenwert bis 90-fach); häufigste asbestbedingte Krebserkrankung	Selten (stadienabh.)
Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom)	Kehlkopf (Larynx)	Anhaltende Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Fremdkörpergefühl, Halslymphknoten	20–50 J.	BK 4104	Nachweis Asbestose ODER langjährige hohe Faserbelastung (i. d. R. mind. 25 Faserjahre)	Wissenschaftlich anerkannter Zusammenhang; Synergieeffekt mit Rauchen und Alkohol	Selten (stadienabh.)
Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)	Eierstöcke (Ovarien)	Bauchschmerzen, Völlegefühl Zunahme Bauchumfang, Harn-drang, Verdauungsbeschwerden	Bis 40 J.	§ 9 Abs. 2 SGB VII (Wie-BK)	Dokumentierter langjähriger Kontakt ODER Vorliegen einer anderen anerkannten asbestbedingten Erkrankung	Seit 2017 anerkenbar; nicht in BKV-Liste, sondern über Öffnungsklausel; Fasern dringen bis in Eierstöcke vor	Selten (stadienabh.)

Faserjahr-Definition	Nachgehende Vorsorge / EVA-Lunge	Anerkennungshürde Krebs	Meldepflicht & Expositionsverzeichnis
1 Faserjahr = Exposition gegenüber 1 Mio. kritischer Fasern/m ³ über 8 Std./Tag an 240 Arbeitstagen/Jahr. Wissenschaftliche Studien zeigen: Lungenkrebsrisiko steigt bereits ab 0,5 Faserjahren.	Lebenslanger Anspruch auf arbeitsmedizinische Betreuung bei relevanter Exposition. Früherkennungsprogramm EVA-Lunge (Niedrigdosis-CT) für Hochrisikogruppe: BK 4103 + Raucherhistorie + Alter > 55 Jahre.	Für Lungen-, Kehlkopf- oder Eierstockkrebs ohne bestehende Asbestose i. d. R. Nachweis von mind. 25 Faserjahren erforderlich.	Bereits bei Verdacht auf asbestbedingte Berufskrankheit besteht Meldepflicht – für Ärzte und Betriebe. Arbeitgeber sind verpflichtet, ein Expositionsverzeichnis für alle exponierten Beschäftigten zu führen.